

MECCADERMA®

Terbinafine HCl 1%

Antifungal Cream

KEGUNAAN

Anti jamur / Antifungal

KOMPOSISI:

Tiap gram mengandung Terbinafine HCl 10 mg.

FARMAKOLOGI

Terbinafine HCl memiliki daya antifungi dengan spektrum yang luas dan memiliki aktivitas fungisidal terhadap dermatofit dan ragi. Terbinafine HCl membunuh sel jamur dengan mencegah epoxidase squalene, enzim utama dalam biosintesa sterol, yang mengakibatkan kekurangan ergosterol pada dalam dinding sel jamur.

INDIKASI PENGOBATAN

Untuk mengobati topikal infeksi jamur seperti: Tinea Pedis, Tinea Cruris, Tinea Corporis yang disebabkan oleh trichophyton rubrum, trichophyton mentagrophytes, trichophyton verrucosum, trichophyton violaceum, epidermophyton floccosum. Untuk pengobatan cutaneous candidiasis, dan pityriasis versicolor.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Hanya untuk pemakaian luar.
- Hentikan pengobatan jika terjadi iritasi dan sensitifitas.
- Tidak dimaksudkan untuk pengobatan mata, intravaginal atau peroral.
- Hindarkan kontak dengan hidung, mata, mulut, atau membrane mukosa lainnya. Apabila kontak dengan mata terjadi, segera cuci secara menyeluruh dengan air bersih.

CARA PENGGUNAAN

- Bersihkan bagian kulit tubuh yang terkena infeksi terlebih dahulu.
- Setelah kering, oleskan krim secara tipis dan merata pada bagian kulit yang terinfeksi 1-2 kali sehari.
- Tutup kembali tube untuk menghindari kontaminasi, simpan pada suhu dibawah 30° celsius dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Hilangnya gejala klinis biasanya terjadi dalam beberapa hari. Pemakaian secara tidak teratur atau penghentian terlalu dini dapat menyebabkan resiko kekambuhan.
- Jika tidak terjadi tanda-tanda perbaikan klinis setelah 2 minggu, dianjurkan untuk konsultasi dokter

DURASI PENGOBATAN

Durasi pengobatan yang dianjurkan adalah

- | | |
|--|------------|
| • Kutu Air / Tinea Pedis | 1 Minggu |
| • Kurap / Tinea Corporis | 1-2 Minggu |
| • Infeksi Jamur di selangkangan / Tinea Cruris | 1-2 Minggu |
| • Infeksi Jamur Kandida / Cutaneous Candida | 1-2 Minggu |
| • Panu / Tinea Versicolor | 2 Minggu |

EFEK SAMPING

Iritasi lokal, eritema, kulit terasa terbakar dan kering.

KONTRA INDIKASI

Hipersensitifitas terhadap Terbinafine HCl atau komponen obat.

KEHAMILAN DAN LAKTASI

Pengalaman klinis pada wanita hamil tidak ada, jangan digunakan selama kehamilan kecuali keuntungan dapat melebihi risikonya. Karena Terbinafine HCl diekskresikan dalam air susu ibu, maka Terbinafine HCl tidak boleh digunakan selama menyusui. Jika digunakan secara topical, hanya sebagian kecil obat yang diabsorpsi melalui kulit tetapi efeknya terhadap bayi belum diketahui.

INFORMASI LAINNYA

Simpan pada suhu dibawah 30° C. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

KEMASAN

MECCADERMA®, Krim Tube 5 g, Reg. No. DKL1714400529A1

MECCADERMA®, Krim Tube 10 g, Reg. No. DKL1714400529A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER



Manufactured by:
MECCAYA Pharmaceutical
Bekasi, Indonesia

BNKR-0105-0